

	聯標碼	商品英文名	商品中文名	成分名	劑型	健保碼	衛生署許可字號	健保藥理分類 (ATC CODE)	衛生署核准適應症	藥理作用	大人常用劑量/頻次	小孩常用劑量/頻次	特殊疾病常用劑量及頻次	給藥途徑	最大劑量(每日最大劑量或最大使用劑量)	常見副作用	禁忌(症)	懷孕分級	哺乳分級
範例	0377-1	Clofix F.C.Tablets 75mg	栓暢膜衣錠 75 毫克	Clopidogrel 75mg	膜衣錠	A049967100	衛署藥製 字第049967號	B01AC04	降低近期發生中風、心肌梗塞或周邊脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件(如心肌梗塞、中風或其他因血鈉病變引起的死亡)的發生。與aspirin 併用降低非ST段上升之急性冠心症(不穩定性心絞痛和非Q波型心肌梗塞)病人(包括經皮冠狀動脈介入性治療後放置支架的患者)之粥狀動脈栓塞事件。與aspirin併用可用於以內科治療的ST段上升之急性心肌梗塞病人。	Clopidogrel的作用為選擇性的抑制血小板上ADP受體與ADP之結合，如此便會抑制經由ADP媒介的GPIIb/IIIa複合體的活化作用，進而抑制血小板凝集。Clopidogrel須先經過生體轉換才可產生抑制血小板凝集的作用。除了ADP之外，對於其他可活化血小板的ADP擬似劑，Clopidogrel亦有抑制血小板凝集的作用。	每天75mg, 一天一次，可和食物同時服用或分開服用。	兒童和青少年：對於18歲以下的兒童和青少年，使用本藥之療效及安全性尚未確立。兒童和青少年：對於18歲以下的兒童和青少年，使用本藥之療效及安全性尚未確立。使用方式：一天1次，可和食物同時服用或分開服用。	-	口服	-	消化不良、腹痛、腹瀉。	對藥品主成份或其他非活性成份過敏者。嚴重肝功能不良的患者。正在出血的患者如消化性潰瘍或顱內出血的患者。授乳婦。	B	
新進藥品																			

錠劑、膠囊外觀標記、特徵	錠劑、膠囊直徑(大小)	錠劑、膠囊型狀描述	錠劑、膠囊顏色描述1	錠劑、膠囊顏色描述2	注射劑配置時溶液限制(如肝粉、凍晶製劑)	注射劑藥品配伍禁忌	注射劑給藥濃度	注射劑給藥速度	藥品其他適應症(含off-label use)	健保給付規定限制	起始作用時間(Onset)	作用時限(Duration)	藥物動力學(吸收、分布、代謝、排除)	半衰期(Half-life)	藥理作用機轉	民眾用藥指示	注意事項	藥品警語	使用方法	忘了用藥怎麼辦?	保存方法
一面刻GBL, 另一面刻82	0.8 cm	圓形	肉粉紅	-	-	-	-	-	1.限曾發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人，並符合下列條件之一者使用。(1)對acetylsalicylic acid(如Aspirin)過敏。(2)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道X光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血病史。須於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道X光攝影檢查時間。2.經介入性支架置放術時及治療後3個月內得與acetylsalicylic acid(如Aspirin)合併使用。須於病歷註明介入性支架置放手術之日期。3.用於已發作之非ST段上升之急性冠心症(不穩定性心絞痛和非Q波型心肌梗塞)而住院的病人時，得與acetylsalicylic acid(如Aspirin)合併治療，最長9個月。須於病歷註明住院時間。		2 hours	72 hours	F(口服劑型)=50%，肝代謝比率%=extensive，腎排除比率%=50%	8小時	Clopidogrel的作用為選擇性的抑制血小板上ADP受體與ADP之結合，如此便會抑制經由ADP媒介的GPIIb/IIIa複合體的活化作用，進而抑制血小板凝集。Clopidogrel須先經過生體轉換才可產生抑制血小板凝集的作用。除了ADP之外，對於其他可活化血小板的ADP擬似劑，Clopidogrel亦有抑制血小板凝集的作用。Clopidogrel的作用主要是改變血小板上的ADP受體，此作用是不可逆的，因此，凡接觸到Clopidogrel的血小板，在體內的壽命期間均會受到影響，其恢復正常血小板功能的速率和血小板新生的速率一致。	若發現任何不正常出血狀況時，應立即看醫生。在進行任何手術或服用藥品前，病人應告知醫師或牙醫師目前服用Clopidogrel。	和其他抗血小板製劑一樣，Clopidogrel應小心使用於可能有出血危險的病人(如：創傷、手術或其他病理狀況的病人)。若病人選擇手術治療並且不希望在手術期間有抗血小板作用者，應於手術前7天停止使用Clopidogrel。Clopidogrel會延長出血時間，應小心使用於罹患可能併發流血病變的病人(特別是胃腸道和眼內出血的病人)。	由於有血液學方面的不良反應和出血的危險，在治療期間應檢驗血球計數，且當出現有出血的臨床症狀時應立即進行適當的檢查(請參考“不良反應”欄)。和其他抗血小板製劑一樣，Clopidogrel應小心使用於可能有出血危險的病人，例如：創傷、手術、其他病理狀況或接受ASA、非固醇類抗炎止痛劑(NSAID)包括Cox-2抑制劑、肝素或glycoprotein IIb/IIIa抑制劑。病人應小心注意任何可能的出血徵兆，包括隱匿性的出血，特別是在治療開始的第一週及手術或侵襲性心臟檢查後。由於可能會增加出血的危險，warfarin不建議與Clopidogrel併用	每天75mg，一天一次，可和食物同時服用或分開服用。	想起時儘快服用。但如果已經接近下次服藥時間，則服用下一次的劑量即可。切勿同時服用兩次的劑量。	25度C以下室溫儲存，避免潮濕及光線照射。