

病人服用威爾鋼(Viagra)須知

威爾鋼(Viagra)是治療男性勃起功能障礙的口服藥物之一，並不是賀爾蒙也不是春藥，它的作用在於增加陰莖血管平滑肌的放鬆，而使血流增加而加強陰莖的勃起，但不會引起身體內其他平滑肌的放鬆。威爾鋼引起副作用約為 2.5%，包含：輕度頭痛(16%)、臉潮紅(11%)、胃口差(7%)、暫時視覺障礙(3%)、等。引起其他嚴重併發症的機率小於 2%。服用威爾鋼時，應避免同時使用其他壯陽藥物或器具。威爾鋼有三種劑量，25、50 及 100 毫克作為調整，若服用數次無效者，建議停止使用。十八歲以上男性有勃起障礙可考慮服用，但年輕者一般不需使用此藥物。

【注意事項】

1. 在性交之前 1 小時服用，建議一天只服一次，一個月不超過 6 次。正常性功能者不需使用此藥物。

必須與食物分開服用避免高油脂食物一起服用。服用後必須有性刺激，一天最大劑量一顆。

2. 在高血壓患者服用降血壓藥物中有“硝酸類(Nitrates)”者，嚴禁使用“威爾鋼”，以免血壓下降太多，休克、或死亡。

3. 有心血管疾病不適合進行性行為者，最近 6 個月有中風，心肌梗塞，不穩定型心絞痛及退化性視網膜病變者，不宜服用威爾鋼(Viagra)。

4. 服用藥物後，如陰莖持續勃起超過 2 小時，請速至外科急診室處理。

5. 服用藥物 3 小時內，請勿駕車，因可能會有短暫視覺障礙。

6. 以下為一些常見之“硝酸類”口服藥物：

Amyl Nitrite, Nitroglycerin, Tridil, Nitrostat, Imdur, Corangin, Ismo, Isormol, Nitorol, Isoket, Isordil, Sorbitrate, Cardilate, Glyceryl trinitrate, Nitrocotin, Pectolex, Nipride